

別表 セグロウリミバエ防除に用いる農薬

現在、農作物におけるセグロウリミバエの防除に使用可能な登録薬剤はないが、植物防疫法第29条第1項に基づく措置として、発生ほ場では農薬の登録内容を守り、以下の農薬による防除を行うことが可能。

【ウリ科野菜】

きゅうり

農薬の名称（屋号抜き）	農薬の種類	希釈倍率	散布量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	総使用回数
アクタラ顆粒水溶液	チアメトキサム水溶液	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内)
アグロスリン水和剤	シベルメトリン水和剤	1,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	5回以内	5回以内
アニキ乳剤	レピメクチン乳剤	1,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内
アフファーム乳剤	エマメクチン安息香酸塩乳剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	2回以内
コルト顆粒水溶液	ピリフルキナゾン水和剤	4,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内
スカウトフロアブル	トラロメトリン水和剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	4回以内	4回以内
スタークル顆粒水溶液 (アルバリン顆粒水溶液)	ジノテフラン水溶液	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	4回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内)
スピノエース顆粒水溶液	スピノサド水和剤	5,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	2回以内
ダントツ水溶液	クロチアニジン水溶液	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	4回以内 (育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内)
ディアナSC	スピネトラム水和剤	2,500倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	2回以内
テルスターフロアブル	ピフェントリン水和剤	4,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内
トレボン乳剤	エトフェンプロックス乳剤	1,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内
プレオフロアブル	ピリダリル水和剤	1,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	2回以内
プレバソフロアブル5	クロラントラニプロール水和剤	1,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内)
ベネビアOD	シアントラニプロール水和剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	4回以内 (定植時までの処理及び定植直後の株元灌注は合計1回以内、定植後の散布は3回以内)
マブリック水和剤20	フルバリネット水和剤	4,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	2回以内
マラソン乳剤	マラソン乳剤	1,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内
マラソン粉剤3	マラソン粉剤	3kg/10a	—	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内
モスピラン顆粒水溶液	アセタミプリド水溶液	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	5回以内 (粒剤の定植時までの処理は1回以内、2%粒剤の定植後の株元散布は1回以内、散布、くん煙及び1%粒剤の株元散布は合計3回以内)

きゅうり(施設栽培)

農薬の名称（屋号抜き）	農薬の種類	希釈倍率	散布量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	総使用回数
アドマイヤーフロアブル	イミダクロプリド水和剤	4,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	4回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び常温煙霧は合計3回以内)

すいか

農薬の名称（屋号抜き）	農薬の種類	希釈倍率	散布量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	総使用回数
アクタラ顆粒水溶剤	チアメトキサム水溶剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	4回以内 (粒剤の処理は1回以内、散布は3回以内)
アグロスリン水和剤	シベルメトリン水和剤	1,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	5回以内	5回以内
アドマイヤーフロアブル	イミダクロプリド水和剤	4,000倍	100～300L/10a	収穫3日前まで (ただし、露地栽培については着果後)	散布	3回以内	4回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内)
アニキ乳剤	レビメクチン乳剤	1,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内
アフーム乳剤	エマメクチン安息香酸塩乳剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内
アベンジャーフロアブル	フロメトキン水和剤	1,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内
エルサン乳剤	PAP乳剤	1,000倍	100～300L/10a	収穫3日前まで	散布	3回以内	3回以内
グレーシア乳剤	フルキサメタミド乳剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	2回以内
コルト顆粒水和剤	ピリフルキナゾン水和剤	4,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内
スカウトフロアブル	トラロメトリン水和剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	5回以内	5回以内
スタークル顆粒水溶剤 (アルバリン顆粒水溶剤)	ジノテフラン水溶剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	散布	2回以内	4回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内)
スピノエース顆粒水和剤	スピノサド水和剤	5,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	2回以内
ダントツ水溶剤	クロチアニジン水溶剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	4回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内)
ディアナSC	スピネトラム水和剤	2,500倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	2回以内
トレボン乳剤	エトフェンブロックス乳剤	1,000倍	100～300L/10a	収穫3日前まで	散布	3回以内	3回以内
ハチハチフロアブル	トルフェンピラド水和剤	1,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	2回以内
ファインセーフフロアブル	フロメトキン水和剤	1,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内
プレオフロアブル	ピリダリル水和剤	1,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	2回以内
プレバソフロアブル5	クロラントラニプロール水和剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内
マブリック水和剤20	フルバリネット水和剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫3日前まで	散布	2回以内	2回以内
マラソン乳剤	マラソン乳剤	1,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	6回以内	6回以内
マラソン粉剤3	マラソン粉剤	3kg/10a	—	収穫前日まで	散布	6回以内	6回以内
モスピラン顆粒水溶剤	アセタミプリド水溶剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫3日前まで	散布	3回以内	4回以内 (粒剤の定植時までの処理は1回以内、散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計3回以内)

かぼちゃ

農薬の名称（屋号抜き）	農薬の種類	希釈倍率	散布量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	総使用回数
アドマイヤーフロアブル	イミダクロプリド水和剤	4,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで (ただし、露地栽培については着果後)	散布	2回以内	3回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)
アフーム乳剤	エマメクチン安息香酸塩乳剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	2回以内
エルサン乳剤	PAP乳剤	1,000倍	100～300L/10a	収穫3日前まで	散布	3回以内	3回以内
コルト顆粒水和剤	ピリフルキナゾン水和剤	4,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内
スタークル顆粒水溶剤 (アルバリン顆粒水溶剤)	ジノテフラン水溶剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	3回以内 (定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内)
ダントツ水溶剤	クロチアニジン水溶剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫3日前まで	散布	3回以内	4回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内)
ディアナSC	スピネトラム水和剤	2,500倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	2回以内
トリガード液剤	シロマジン液剤	1,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内
トレボン乳剤	エトフェンブロックス乳剤	1,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内
ベネビアOD	シアントラニプロール水和剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内
マブリック水和剤20	フルバリネット水和剤	4,000倍	100～300L/10a	収穫21日前まで	散布	2回以内	2回以内
マラソン乳剤	マラソン乳剤	1,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	5回以内	5回以内
マラソン粉剤3	マラソン粉剤	3kg/10a	—	収穫前日まで	散布	5回以内	5回以内
モスピラン顆粒水溶剤	アセタミプリド水溶剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	3回以内 (粒剤の定植時までの処理は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内)

メロン

農薬の名称(屋号抜き)	農薬の種類	希釈倍率	散布量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	総使用回数
アクタラ顆粒水溶剤	チアメトキサム水溶剤	2,000倍	150~300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内)
アグロスリン水和剤	シベルメトリン水和剤	1,000倍	100~300L/10a	収穫前日まで	散布	5回以内	5回以内
アドマイヤーフロアブル	イミダクロプリド水和剤	4,000倍	100~300L/10a	収穫3日前まで (ただし、露地栽培については着果後)	散布	3回以内	4回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は3回以内)
アニキ乳剤	レビメクチン乳剤	2,000倍	100~300L/10a	収穫前日まで	散布	4回以内	4回以内
アフーム乳剤	エマメクチン安息香酸塩乳剤	2,000倍	100~300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	2回以内
エルサン乳剤	PAP乳剤	1,000倍	100~300L/10a	収穫3日前まで	散布	4回以内	4回以内
オリオン水和剤40	アラニカルブ水和剤	1,000倍	100~300L/10a	収穫前日まで	散布	5回以内	5回以内
グレーシア乳剤	フルキサメタミド乳剤	2,000倍	100~300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	2回以内
コルト顆粒水和剤	ピリフルキナゾン水和剤	4,000倍	100~300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内
スカウトフロアブル	トラロメトリン水和剤	2,000倍	100~300L/10a	収穫前日まで	散布	5回以内	5回以内
スタークル顆粒水溶剤 (アルバリン顆粒水溶剤)	ジノテフラン水溶剤	2,000倍	100~300L/10a	収穫3日前まで	散布	2回以内	3回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内)
スピノエース顆粒水和剤	スピノサド水和剤	5,000倍	100~300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	2回以内
ダントツ水溶剤	クロチアニジン水溶剤	2,000倍	100~300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	4回以内 (育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内)
ディアナSC	スピネトラム水和剤	2,500倍	100~300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	2回以内
トリガード液剤	シロマジン液剤	1,000倍	100~300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内
トレボン乳剤	エトフェンブロックス乳剤	1,000倍	100~300L/10a	収穫3日前まで	散布	4回以内	4回以内
プレオフロアブル	ピリダリル水和剤	1,000倍	100~300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	2回以内
プレバソフロアブル5	クロラントラニリプロール水和剤	2,000倍	100~300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内
マブリック水和剤20	フルバリネート水和剤	2,000倍	100~300L/10a	収穫3日前まで	散布	2回以内	2回以内
マラソン乳剤	マラソン乳剤	1,000倍	100~300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内
マラソン粉剤3	マラソン粉剤	3kg/10a	—	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内

とうがん

農薬の名称(屋号抜き)	農薬の種類	希釈倍率	散布量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	総使用回数
スピノエース顆粒水和剤	スピノサド水和剤	5,000倍	100~300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	2回以内
ダントツ水溶剤	クロチアニジン水溶剤	2,000倍	100~300L/10a	収穫3日前まで	散布	3回以内	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内)
ディアナSC	スピネトラム水和剤	2,500倍	100~300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	2回以内
トリガード液剤	シロマジン液剤	1,000倍	100~300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内
プレオフロアブル	ピリダリル水和剤	1,000倍	100~300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	2回以内
プレバソフロアブル5	クロラントラニリプロール水和剤	2,000倍	100~300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内

にがうり

農薬の名称(屋号抜き)	農薬の種類	希釈倍率	散布量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	総使用回数
アクタラ顆粒水溶剤	チアメトキサム水溶剤	2,000倍	100~300L/10a	収穫7日前まで	散布	3回以内	3回以内
アフーム乳剤	エマメクチン安息香酸塩乳剤	2,000倍	100~300L/10a	収穫3日前まで	散布	2回以内	2回以内
コルト顆粒水和剤	ピリフルキナゾン水和剤	4,000倍	100~300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内
スタークル顆粒水溶剤 (アルバリン顆粒水溶剤)	ジノテフラン水溶剤	2,000倍	100~300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	3回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)
ダントツ水溶剤	クロチアニジン水溶剤	2,000倍	100~300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	4回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内)
トレボン乳剤	エトフェンブロックス乳剤	1,000倍	100~300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内
プレオフロアブル	ピリダリル水和剤	1,000倍	100~300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	2回以内
プレバソフロアブル5	クロラントラニリプロール水和剤	2,000倍	100~300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内
マラソン乳剤	マラソン乳剤	1,000倍	100~300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内
モスピラン顆粒水溶剤	アセタミプリド水溶剤	4,000倍	100~300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内

食用へちま

農薬の名称(屋号抜き)	農薬の種類	希釈倍率	散布量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	総使用回数
アクタラ顆粒水溶剤	チアメトキサム水溶剤	2,000倍	100~300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内
スピノエース顆粒水和剤	スピノサド水和剤	5,000倍	100~300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	2回以内
ダントツ水溶剤	クロチアニジン水溶剤	2,000倍	100~300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内)

しろりり

農業の名称 (屋号抜き)	農業の種類	希釈倍率	散布量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	総使用回数
エルサン乳剤	P A P 乳剤	1,000倍	100～300L/10a	収穫3日前まで	散布	3回以内	3回以内
コルト顆粒水和剤	ピリフルキナゾン水和剤	4,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内
マラソン粉剤3	マラソン粉剤	3kg/10a	—	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内

うり類 (漬物用)

(※赤毛ウリ, 食用ひょうたん, 食用へちま, しろりり, 漬物用すいか, 漬物用まくわり, 漬物用メロン, とうがん, はやとうり, ゆうがお に使用可能)

農業の名称 (屋号抜き)	農業の種類	希釈倍率	散布量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	総使用回数
アフーム乳剤	エマメクチン安息香酸塩乳剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	2回以内
スタークル顆粒水溶剤 (アルバリン顆粒水溶剤)	ジノテフラン水溶剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	3回以内 (定植時の土壌混和は1回以内, 散布は2回以内)
マラソン乳剤	マラソン乳剤	1,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内
モスピラン顆粒水溶剤	アセタミプリド水溶剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内

うり類 (未成熟)

(※赤毛ウリ, エホバク, きゅうり, きゅうり(花), 食用ひょうたん, 食用へちま, しろりり, とうがん, はやとうり, ゆうがお, ズッキーニ, スッキーニ(花), にがうりに使用可能)

農業の名称 (屋号抜き)	農業の種類	希釈倍率	散布量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	総使用回数
グレーシア乳剤	フルキサメタミド乳剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	2回以内

うり類 (成熟, ただし, すいか, メロンを除く)

(※かぼちゃ, 漬物用すいか, まくわり, 漬物用まくわり, 漬物用メロン に使用可能)

農業の名称 (屋号抜き)	農業の種類	希釈倍率	散布量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	総使用回数
グレーシア乳剤	フルキサメタミド乳剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	2回以内

ズッキーニ

農業の名称 (屋号抜き)	農業の種類	希釈倍率	散布量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	総使用回数
アフーム乳剤	エマメクチン安息香酸塩乳剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫3日前まで	散布	2回以内	2回以内
コルト顆粒水和剤	ピリフルキナゾン水和剤	4,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内
スタークル顆粒水溶剤 (アルバリン顆粒水溶剤)	ジノテフラン水溶剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	4回以内 (定植時の土壌混和は1回以内, 定植後の株元散布は1回以内, 散布は2回以内)
スピノエース顆粒水和剤	スピノサド水和剤	5,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内
プレバソフフロアブル5	クロラントラニリプロール水和剤	1,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内

まくわり

農業の名称 (屋号抜き)	農業の種類	希釈倍率	散布量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	総使用回数
エルサン乳剤	P A P 乳剤	1,000倍	100～300L/10a	収穫3日前まで	散布	4回以内	4回以内
スタークル顆粒水溶剤 (アルバリン顆粒水溶剤)	ジノテフラン水溶剤	3,000倍	100～300L/10a	収穫3日前まで	散布	2回以内	2回以内
モスピラン顆粒水溶剤	アセタミプリド水溶剤	4,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	2回以内

【ナス科野菜】

トマト

農薬の名称（屋号抜き）	農薬の種類	希釈倍率	散布量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	総使用回数
アクタラ顆粒水溶剤	チアメトキサム水溶剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内)
アグロスリン水和剤	シベルメトリン水和剤	1,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	5回以内	5回以内
アドマイヤーフロアブル	イミダクロプリド水和剤	4,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	3回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内)
アニキ乳剤	レピメクチン乳剤	1,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内
アフーム乳剤	エマメクチン安息香酸塩乳剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	5回以内	5回以内
アベンジャーフロアブル	フロメトキン水和剤	1,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内
グレーシア乳剤	フルキサメタミド乳剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	2回以内
コルト顆粒水和剤	ピリフルキナゾン水和剤	4,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内
スタークル顆粒水溶剤 (アルバリン顆粒水溶剤)	ジノテフラン水溶剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	5回以内 (培土混和及び灌注は合計1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内)
スピノエース顆粒水和剤	スピノサド水和剤	5,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	2回以内
ダントツ水溶剤	クロチアニジン水溶剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	4回以内 (育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内)
ディアナSC	スピネトラム水和剤	2,500倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	2回以内
テルスターフロアブル	ピフェントリン水和剤	4,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	2回以内
トリガード液剤	シロマジン液剤	1,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内
トレボン乳剤	エトフェンブロックス乳剤	1,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	2回以内
ファインセーフフロアブル	フロメトキン水和剤	1,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内
ブレオフロアブル	ピリダリル水和剤	1,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	2回以内
ブレバソフフロアブル5	クロラントラニリプロール水和剤	1,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内)
ベネピアOD	シアントラニリプロール水和剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	5回以内 (定植時までの処理及び定植直後の株元灌注は合計1回以内、定植後の株元灌注は1回以内、定植後の散布は3回以内)
マラソン乳剤	マラソン乳剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	5回以内	5回以内
マラソン粉剤3	マラソン粉剤	3kg/10a	—	収穫前日まで	散布	5回以内	5回以内
モスピラン顆粒水溶剤	アセタミプリド水溶剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	4回以内 (粒剤の定植時までの処理は1回以内、散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計3回以内)

ミニトマト

農薬の名称（屋号抜き）	農薬の種類	希釈倍率	散布量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	総使用回数
アクタラ顆粒水溶剤	チアメトキサム水溶剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	3回以内 (粒剤の処理は1回以内, 散布は2回以内)
アグロリン水和剤	シベルメトリン水和剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	2回以内
アドマイヤーフロアブル	イミダクロプリド水和剤	4,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	3回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内, 散布は2回以内)
アニキ乳剤	レピメクチン乳剤	1,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内
アフーム乳剤	エマメクチン安息香酸塩乳剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	5回以内	5回以内
アベンジャーフロアブル	フロメトキン水和剤	1,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内
グレーシア乳剤	フルキサメタミド乳剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	2回以内
コルト顆粒水和剤	ピリフルキナゾン水和剤	4,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内
スタークル顆粒水溶剤 (アルバリン顆粒水溶剤)	ジノテフラン水溶剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	5回以内 (培土混和及び灌注は合計1回以内, 育苗期の株元散布は1回以内, 定植時の土壌混和は1回以内, 散布及び定植後の株元散布は合計2回以内)
スピノエース顆粒水和剤	スピノサド水和剤	5,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	2回以内
ダントツ水溶剤	クロチアニジン水溶剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	4回以内 (育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内, 散布及び定植後の株元散布は合計3回以内)
ディアナSC	スピネトラム水和剤	2,500倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	2回以内
テルスターフロアブル	ピフェントリン水和剤	4,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	2回以内
トリガード液剤	シロマジン液剤	1,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	2回以内
ファインセーブフロアブル	フロメトキン水和剤	1,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内
ブレオフロアブル	ピリダリル水和剤	1,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	2回以内
ブレバゾンフロアブル5	クロラントラニリプロール水和剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	4回以内 (灌注は1回以内, 散布は3回以内)
ベネビアOD	シアントラニリプロール水和剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	5回以内 (定植時までの処理及び定植直後の株元灌注は合計1回以内, 定植後の株元灌注は1回以内, 定植後の散布は3回以内)
モスピラン顆粒水溶剤	アセタミプリド水溶剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	4回以内 (粒剤の定植時までの処理は1回以内, 散布, くん煙及び定植後の株元散布は合計3回以内)

ピーマン

農薬の名称（屋号抜き）	農薬の種類	希釈倍率	散布量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	総使用回数
アクタラ顆粒水溶剤	チアメトキサム水溶剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内)
アグロスリン水和剤	シベルメトリン水和剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	5回以内	5回以内
アニキ乳剤	レビメクチン乳剤	1,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内
アフーム乳剤	エマメクチン安息香酸塩乳剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	2回以内
アベンジャーフロアブル	フロメトキン水和剤	1,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内
グレースア乳剤	フルキサメタミド乳剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	2回以内
コルト顆粒水和剤	ピリフルキナゾン水和剤	4,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	2回以内
スタークル顆粒水溶剤 (アルバリン顆粒水溶剤)	ジノテフラン水溶剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	3回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内)
スピノエース顆粒水和剤	スピノサド水和剤	5,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	2回以内
ダントツ水溶剤	クロチアニジン水溶剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	3回以内 (定植時までの処理は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内)
ディアナSC	スピネトラム水和剤	2,500倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	2回以内
トレボン乳剤	エトフェンブロックス乳剤	1,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内
ファインセーブフロアブル	フロメトキン水和剤	1,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内
プレオフロアブル	ピリダリル水和剤	1,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	2回以内
プレバソフフロアブル5	クロラントラニリプロール水和剤	1,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	3回以内 (灌水は1回以内、散布は2回以内)
ベネビアOD	シアントラニリプロール水和剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	4回以内 (定植時までの処理及び定植直後の株元灌水は合計1回以内、定植後の散布は3回以内)
マラソン乳剤	マラソン乳剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	5回以内	5回以内
マラソン粉剤3	マラソン粉剤	3kg/10a	ー	収穫前日まで	散布	5回以内	5回以内
モスビラン顆粒水溶剤	アセタミプリド水溶剤	4,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	3回以内 (粒剤の定植時までの処理は1回以内、散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計2回以内)

ピーマン（施設栽培）

農薬の名称（屋号抜き）	農薬の種類	希釈倍率	散布量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	総使用回数
アドマイヤーフロアブル	イミダクロプリド水和剤	4,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	3回以内 (育苗期の株元散布および定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内)

とうがらし類

農薬の名称（屋号抜き）	農薬の種類	希釈倍率	散布量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	総使用回数
アニキ乳剤	レビメクチン乳剤	1,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内
アフーム乳剤	エマメクチン安息香酸塩乳剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	散布	2回以内	2回以内
グレースア乳剤	フルキサメタミド乳剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	2回以内
スタークル顆粒水溶剤 (アルバリン顆粒水溶剤)	ジノテフラン水溶剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	4回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内)
ダントツ水溶剤	クロチアニジン水溶剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内
ディアナSC	スピネトラム水和剤	2,500倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	2回以内
プレオフロアブル	ピリダリル水和剤	1,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	2回以内
プレバソフフロアブル5	クロラントラニリプロール水和剤	1,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	4回以内 (灌水は1回以内、散布は3回以内)

とうがらし類（ししとうを除く）

農薬の名称（屋号抜き）	農薬の種類	希釈倍率	散布量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	総使用回数
アクタラ顆粒水溶剤	チアメトキサム水溶剤	3,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	4回以内 (定植時の植穴処理は1回以内、散布は3回以内)

とうがらし類（甘長とうがらしを除く）

農薬の名称（屋号抜き）	農薬の種類	希釈倍率	散布量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	総使用回数
コルト顆粒水和剤	ピリフルキナゾン水和剤	4,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	2回以内

ししとう

農薬の名称（屋号抜き）	農薬の種類	希釈倍率	散布量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	総使用回数
アクタラ顆粒水溶剤	チアメトキサム水溶剤	3,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	4回以内 (定植時の植穴処理は1回以内、散布は3回以内)
アベンジャーフロアブル	フロメトキン水和剤	1,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内
スピノエース顆粒水和剤	スピノサド水和剤	20,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	2回以内
ファインセーブフロアブル	フロメトキン水和剤	1,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内
ベネビアOD	シアントラニリプロール水和剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	4回以内 (灌水は1回以内、散布は3回以内)

【その他】

パッションフルーツ

農薬の名称（屋号抜き）	農薬の種類	希釈倍率	散布量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	総使用回数
モスピラン顆粒水溶剤	アセタミプリド水溶剤	2,000倍	200～700L/10a	収穫30日前まで	散布	2回以内	2回以内

スモモ

農薬の名称（屋号抜き）	農薬の種類	希釈倍率	散布量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	総使用回数
アクタラ顆粒水溶剤	チアメトキサム水溶剤	2,000倍	200～700L/10a	収穫7日前まで	散布	2回以内	2回以内
アグロスリン水和剤	シベルメトリン水和剤	1,000倍	200～700L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	2回以内
オリオン水和剤 40	アラニカルブ水和剤	1,000倍	200～700L/10a	収穫7日前まで	散布	3回以内	3回以内
コルト顆粒水和剤	ピリフルキナゾン水和剤	2,000倍	200～700L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内
スカウトフロアブル	トラロメトリン水和剤	2,000倍	200～700L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内
スタークル顆粒水溶剤 (アルバリン顆粒水溶剤)	ジノテフラン水溶剤	2,000倍	200～700L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内
ダントツ水溶剤	クロチアニジン水溶剤	2,000倍	200～700L/10a	収穫3日前まで	散布	3回以内	3回以内
テルスターフロアブル	ピフェントリン水和剤	3,000倍	200～700L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	2回以内
ハチハチフロアブル	トルフェンピラド水和剤	2,000倍	200～700L/10a	収穫14日前まで	散布	2回以内	2回以内
モスピラン顆粒水溶剤	アセタミプリド水溶剤	2,000倍	200～700L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内

パパイヤ

農薬の名称（屋号抜き）	農薬の種類	希釈倍率	散布量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	総使用回数
ダントツ水溶剤	クロチアニジン水溶剤	2,000倍	200～700L/10a	収穫3日前まで	散布	3回以内	3回以内

ビタヤ

(※通称：ドラゴンフルーツ)

農薬の名称（屋号抜き）	農薬の種類	希釈倍率	散布量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	総使用回数
アドマイヤーフロアブル	イミダクロプリド水和剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	散布	2回以内	2回以内

グアバ（果実）

農薬の名称（屋号抜き）	農薬の種類	希釈倍率	散布量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	総使用回数
アクタラ顆粒水溶剤	チアメトキサム水溶剤	2,000倍	200～700L/10a	収穫7日前まで	散布	2回以内	2回以内

さやいんげん

農薬の名称（屋号抜き）	農薬の種類	希釈倍率	散布量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	総使用回数
アフーム乳剤	エマメクチン安息香酸塩乳剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	2回以内
アベンジャーフロアブル	フロメトキン水和剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	2回以内
エルサン乳剤	PAP乳剤	1,000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	散布	1回	1回
コルト顆粒水和剤	ビリフルキナゾン水和剤	4,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内
スタークル顆粒水溶剤 (アルバリン顆粒水溶剤)	ジノテフラン水溶剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	3回以内 (株元散布は1回以内、散布は2回以内)
スピノエース顆粒水和剤	スピノサド水和剤	5,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内
ディアナSC	スピネトラム水和剤	2,500倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	2回以内
トレボン乳剤	エトフェンブロックス乳剤	1,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	2回以内
ブレオフロアブル	ピリダリル水和剤	1,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	2回以内
ブレバソフフロアブル5	クロラントラニリプロール水和剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内
ベネビアOD	シアントラニリプロール水和剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内
マラソン粉剤3	マラソン粉剤	3kg/10a	—	収穫7日前まで	散布	3回以内	3回以内
モスピラン顆粒水溶剤	アセタミプリド水溶剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内

豆類(未成熟、ただし、えだまめを除く)

農薬の名称（屋号抜き）	農薬の種類	希釈倍率	散布量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	総使用回数
グリーンア乳剤	フルキサメタミド乳剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	2回以内
ダントツ水溶剤	クロチアニジン水溶剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫3日前まで	散布	3回以内	3回以内

豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやえんどうを除く)

農薬の名称（屋号抜き）	農薬の種類	希釈倍率	散布量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	総使用回数
アニキ乳剤	レビメクチン乳剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内

豆類(未成熟)

農薬の名称（屋号抜き）	農薬の種類	希釈倍率	散布量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	総使用回数
マラソン乳剤	マラソン乳剤	1,000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	散布	3回以内	3回以内